

SÍNDROME DE CAPGRAS COMO CAUSAL DE ANULACIÓN
DE COMPRENSIÓN Y AUTODETERMINACIÓN

Hollman Salamanca Dimas, Julián Leonardo Castiblanco Quintero
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Correo electrónico: Hollman,salamanca@medicinalegal.gov.co
Palabras clave: Síndrome de Capgras, Psicosis Inducidas por Sustancias, comprensión, autodeterminación

Introducción

El síndrome de Capgras es un trastorno neuropsiquiátrico donde el individuo cree que personas cercanas han sido reemplazadas por impostores, lo que puede afectar su capacidad de comprensión y autodeterminación. Su diagnóstico preciso en contextos forenses es clave para evaluar la disposición judicial adecuada del individuo.



Descripción del caso

Varón de aproximadamente 50 años en prisión preventiva por homicidio agravado contra su madre. Con antecedentes de abuso sexual en la infancia y consumo de drogas desde los 17 años (clorhidrato de cocaína, cannabis, dietilamida de ácido lisérgico (LSD), MDMA, psilocibina, tolueno inhalado), desarrollando temporalmente síntomas psicóticos graves que requirieron manejo en unidad de salud mental y psicomedicación. En el momento de los hechos, el examinado presentó consumo activo de cannabis desarrollando alucinaciones visuales, auditivas y táctiles, ideas delirantes de transmisión de pensamiento, persecutorias y de falsa identificación, creyendo que sus familiares, incluida su madre, eran impostores. Esta creencia lo llevó a agredir mortalmente a su madre con un arma blanca.



Valoración psiquiátrica forense

Se utilizó el Protocolo de Evaluación Básica en Psiquiatría Forense y la Guía para la Realización de Pericias Psiquiátricas Forenses sobre Capacidad de Comprensión y Autodeterminación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se estableció el diagnóstico clínico de un trastorno mental y del comportamiento debido al uso de cannabinoides: trastorno psicótico (F125), según las clasificaciones del CIE-10, sobre un antecedente de trastorno mental y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y otras sustancias psicoactivas: síndrome de dependencia (F192), también según el CIE-10. Este trastorno anuló su capacidad de comprensión y autodeterminación en el momento de los hechos, constituyendo un trastorno mental transitorio con base patológica en términos forenses. Al momento de la valoración, el examinado persistía con síntomas psicóticos y riesgo suicida activo, por lo que se sugirió un manejo psicofarmacológico e integral intrahospitalario en beneficio de su salud mental.

Discusión

El síndrome de Capgras es un trastorno neuropsiquiátrico en el que una persona cree que alguien cercano, generalmente un familiar o amigo, ha sido reemplazado por un impostor idéntico, suele manifestarse en contextos de esquizofrenia, trastornos afectivos psicóticos, trastornos neurocognitivos, neurológicos o psicosis inducidas por sustancias. Neurobiológicamente, se asocia con una alteración en las conexiones entre el sistema límbico, áreas de reconocimiento facial en el cerebro, disfunción del lóbulo temporal y frontal. Este desajuste puede provocar que el individuo experimente creencias erróneas y persistentes, limitando su capacidad para comprender su conducta y sus consecuencias. Su tratamiento se enfoca en manejo antipsicótico, psicoterapia y tratamiento específico de la causa subyacente.



Conclusiones



El delirio de Capgras es una condición neuropsiquiátrica poco frecuente que puede presentarse en diversas patologías psiquiátricas, requiere un estudio y tratamiento pertinentes. En un contexto forense, si se evidencia, se debe evaluar su relación con los hechos investigados y si influye en la capacidad de comprensión, autodeterminación o en el estado de salud actual del individuo.